KO RAT

CEBO EN BLOQUES, LISTO PARA SU USO

Brodifacoum 25ppm

COPIA NO VALIDA

KO RAT BRODIFACOUM 25ppm [illegible] para el control de Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*) y rata [illegible] (*Mus musculus*), tanto en [illegible] como en las adultas. Sus efectos no aparecen hasta pasados de 3 a 7 días de la ingesta, [illegible] lo que [illegible] tratando de esta forma su efectividad.

CATEGORÍA DE USUARIO: Uso profesional [illegible]

INSTRUCCIONES DE USO: Realice una encuesta [illegible] tratamiento [illegible] del área infestada y una evaluación in situ para identificar las especies de roedores, sus áreas de actividad y determine la causa y la extensión de la infestación [illegible] el alimento disponible [illegible] roedores (p. ej. grano suelto o residuos de alimentos). Aparte de esto, no limpiar [illegible] antes de tratar [illegible] estos roedores. La adaptación del cebo será más difícil de alcanzar. El producto debe ser usado como [illegible] control de plagas [illegible] otros, medidas de higiene y, cuando sea posible, métodos físicos de control. El producto [illegible] inmediatamente [illegible] se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, signos de anidación, cebaderas, [illegible] madrigueras [illegible]). Cuando sea posible, el portacebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras. Cuando el producto se [illegible] en zonas públicas, [illegible] deben marcarse durante el período de tratamiento y una señal explicativa debe informar sobre el riesgo de envenenamiento secundario [illegible] los anticoagulantes así como sobre las medidas de primeros auxilios. Los cebos deben ser asegurados para evitar que [illegible] portacebos. Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales [illegible] el producto. No se debe aplicar en áreas donde los alimentos/piensos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de probables [illegible] puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo. Usar guantes protectores resistentes a productos químicos [illegible] la fase de manipulación. Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. Lavar las manos y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto. La frecuencia de las visitas a las áreas tratadas debe ser a criterio del aplicador, en virtud de las circunstancias habituales al comienzo del tratamiento. Esa frecuencia debe ser consistente con las recomendaciones proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas.

Si la cantidad de cebo ingerido es baja en relación al tamaño aparente de la infestación, se debe considerar la colocación de más portacebos y la posibilidad de cambiar a otra fórmula [illegible] cebo. Si después de un período de tratamiento de 35 días se observa que los cebos siguen siendo consumidos y no disminuye la actividad de roedores, debe determinarse la causa. Cuando [illegible] excluidos otros elementos, es probable que para los roedores resistentes haya que considerar el uso de un rodenticida no anticoagulante o un rodenticida anticoagulante más potente. También [illegible] considerar el uso de trampas como una medida de control alternativa. Seguir las instrucciones proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas.

EN INTERIORES: Retirar el producto sobrante al final del tratamiento.

ALREDEDOR DE EDIFICACIONES: Proteger los cebos de las condiciones atmosféricas (ej: lluvia, nieve, etc). Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad. Retirar el producto sobrante al final del tratamiento.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Cebo en bloque, listo para su uso, en portacebos resistentes a la manipulación.

DOSIS

ESPECIE	DOSIS	ÁMBITO DE UTILIZACIÓN
Ratón común (*Mus musculus*)	20-40 gramos de cebo por punto de cebo.	Interiores y alrededores de edificaciones
Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*)	100-200 gramos de cebo por punto de cebo.	Interiores y alrededores de edificaciones

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO: Cuando sea posible, antes del tratamiento informar a los transeúntes (ej: usuarios del área tratada o sus alrededores) sobre la campaña de control de roedores (de acuerdo con el código aplicable de buenas prácticas, si lo hay). Aplicar medidas de control preventivas (ej: taponar agujeros, retirar comida y bebida en la medida de lo posible) para mejorar la ingesta del cebo y reducir la posibilidad de reinvasión. Para reducir el riesgo de envenenamiento secundario, buscar y retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas. No usar el producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de roedores o para monitorizar la actividad de roedores. No usar el producto en tratamientos de cebado por pulsos. No aplicar el producto directamente en madrigueras. No utilizar en áreas donde se sospecha que existe resistencia a la sustancia activa. Los productos no deberían utilizarse más de 35 días sin una evaluación del estado de la infestación y de la eficacia del tratamiento (a menos que se autorice el cebado permanente). No alternar el uso de diferentes sustancias activas anticoagulantes con potencias comparables o menores con el propósito de gestionar las resistencias. Si se alternan, considerar el uso de rodenticidas no anticoagulantes, si existen, o un rodenticida anticoagulante más potente. No lavar el portacebos u otros utensilios utilizados en los puntos de cebo cubiertos o protegidos con agua entre aplicaciones. Eliminar los roedores muertos a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado de acuerdo a la normativa vigente. Se recomienda como método de tratamiento la incineración.

PRIMEROS AUXILIOS: Esta producto contiene una sustancia anticoagulante. En caso de ingestión, los síntomas pueden hacerse evidentes hasta en un plazo de 72 horas. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sangrado de nariz y encías. En casos severos, puede haber moratones y presencia de sangre en heces u orina. Antídoto: vitamina K1 administrada únicamente por personal médico/veterinario.

En caso de exposición dermal, lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón. En caso de exposición ocular, comprueba siempre la presencia de lentes de contacto y retíralas, enjuagar los ojos con líquido para enjuagar los ojos o agua, mantener los ojos abiertos al menos 10 minutos. En caso de exposición oral, enjuagar la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provocar el vómito. Si se ingiere, busque consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase y consulte al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono 91 562 04 20). Contacte con un veterinario en caso de que lo ingiera una mascota. Peligroso para la fauna salvaje. Cuando los portacebos se coloquen cerca de aguas superficiales (ej: ríos, lagos, canales de agua, diques, canal de riego/acequia) o sistemas de drenaje de agua asegúrese de que el cebo no entra en contacto con el agua.

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y SU ENVASE: Al finalizar el tratamiento elimínese el cebo no consumido y el envase a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo a con la normativa vigente. Se recomienda como método de tratamiento la incineración. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el producto almacenado y [illegible] de luz. Mantener fuera del alcance de los niños, pájaros, [illegible] y animales de granja. El producto es estable durante 2 años.

Usado [illegible] provocar [illegible] en los órganos [illegible] sangre tras exposiciones prolongadas o repetidas. [illegible] fuera del alcance de los [illegible]. En caso de exposición manifiesta [illegible] acudir a un médico. Eliminar [illegible] envase y/o su recipiente, así como [illegible] muertos, a través del [illegible] residuos peligrosos autorizado, de [illegible] con la normativa vigente.

Nº de [illegible] en el Registro [illegible]: ES-BBB/AA-[illegible]

ATENCIÓN

COMPOSICIÓN:

Brodifacoum (a.i.) CAS 56[illegible]-10-[illegible] 0,002%
Sustancia de sabor amargo 0,001%
Excipientes c.s.p 100%

CONTENIDO: 12 Kg

LEA Y SIGA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ASÍ COMO CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE ACOMPAÑE AL PRODUCTO O PROPORCIONADA EN EL PUNTO DE VENTA ANTES DE USARLO.

ALMACENAR POR DEBAJO DE 40º, EN UN LUGAR SECO, FRESCO Y BIEN VENTILADO.

UFI: 0E00-W0NC-100U-4CME

MYLVA S.A.
Vía Augusta, 48
08006 Barcelona
Tel. 93 415 32 26
mylva@mylva.es
www.mylva.es