Magnumgel IGRPLUS

CUCARACHAS
CAFARDS
BARATAS

CEBO EN GEL (LISTO PARA SU USO)
APPÂT EN GEL (PRÊT À L'EMPLOI)
ISCO GEL (PRONTO A USAR)

Contenido | Conteúdo | Contenu:
24 x 40 gr

Ref: **3032**

MYLVA S.A.
Telf: 93 415 32 26
E-mail: mylva@mylva.eu
Web: www.mylva.eu

Lote | Lote | Lot:
Caducidad | Expiraçao | Date de péremption:

Magnumgel IGRPLUS

CUCARACHAS
CAFARDS
BARATAS

CEBO EN GEL (LISTO PARA SU USO)
APPÂT EN GEL (PRÊT À L'EMPLOI)
ISCO GEL (PRONTO A USAR)

Ref: **3032**

Contenido | Conteúdo | Contenu:
24 x 40 gr

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LÉASE DETENIDAMENTE LA ETIQUETA
Almacenar entre 5ºC y 45ºC de temperatura

ANTES DE USAR O PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO.
Armazenar entre 5°C e 45°C de temperatura

AVANT D'UTILISER LIRE ATTENTIVEMENT L'ETIQUETTE.
Emmaganiser entre 5ºC - 45ºC

COPIA NO VÁLIDA

P420/01

MYLVA S.A.
Via Augusta, 48
08006 Barcelona
Tel. +34 93 415 32 26
mylva@mylva.eu | www.mylva.eu

CONTAINS Bitrex

ATENCIÓN
ATTENTION
ATENÇÃO

Composición / Composition / Composição

Imidacloprid / Imidaclopride / Imidaclopride (Nº CAS 138261-41-3)	2,15%
S-metopreno / S-méthoprène / S-metopreno (Nº CAS 65733-16-6)	0,50%
OIT / OIT/ OIT (Nº CAS 26530-20-1)	0,04%
Bitrex®	0,008%
Excipientes (c.s.p) / Excipients (q.s.p) / Excipients (q.s.p)	100%

Nº de registro
ES/APP(NA)- 2021-18-00746
Nº d'enregistrement
FR-2021-0043
UFI: MX20-30RD-U00P-A98G

Contenido / Contenu / Conteúdo
40gr e

Magnumgel IGRPLUS

CUCARACHAS
CAFARDS
BARATAS

Uso exclusivo por personal profesional especializado. Antes de usar el producto léase detenidamente el prospecto.

Modo de empleo
Aplicación mediante pistola aplicadora de forma localizada en grietas y rendijas, en áreas de difícil acceso, oscuras, cálidas o con restos de alimentos, en forma de líneas.
Lote y fecha de caducidad impreso en el cartucho.

Utilisation exclusive par du personnel spécialisé. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement la noce.

Mode d'emploi
Application au pistolet applicateur de manière localisée dans les fissures et crevasses, dans endroits inaccessibles, sombres, chauds ou avec des déchets alimentaires, sous forme de lignes.

Lot et date de péremption indiqués sur la cartouche.

Uso exclusivo por pessoal especializado. Antes de usar o produto, leia atentamente o folheto incluso.

Modo de emprego
Aplicação por pistola aplicadora de forma localizada em fendas e fissuras, em locais de difícil acesso, escuros, quentes ou com restos de comida, em forma de linhas.

Lote e validação impressos no cartucho

COPIA NO VALIDA

Magnumgel IGRPLUS

CUCARACHAS

ES **MAGNUM GEL CUCARACHAS IGR PLUS** es un insecticida y regulador del crecimiento contra cucarachas (*Blatta orientalis, Blattella germanica, Periplaneta americana*). El Imidacloprid mata las cucarachas en 2-3 semanas. Además el S-metopreno produce infertilidad en las hembras y las ninfas de forma que no pueden reproducirse ni convertirse en adultos reproductivos. El cebo es atractivo para las cucarachas incluso pasados 4 años de almacenamiento.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de uso: Lea siempre la etiqueta antes de usar el producto y respete todas las instrucciones proporcionadas. Haga una inspección antes de aplicar el producto para ver el nivel de infestación y las áreas afectadas. Utilizar solo en interiores fuera del alcance de niños y animales.

Instrucciones de uso específicas: Las gotas se adhieren a superficies no porosas. Aplicar solo en grietas y hendiduras. Uso interior en casas particulares. Antes del tratamiento, retire toda fuente natural del alimento del área infestada para favorecer la ingestión de gel. Aplique el producto solo como aplicación localizada en grietas y hendiduras donde las cucarachas puedan estar presentes fuera del alcance de niños y animales:

- En lugares inaccesibles: detrás de muebles, etc.
- En lugares oscuros y húmedos: debajo del fregadero, detrás del inodoro, cerca del desagüe, etc.
- En lugares cálidos: grietas y hendiduras detrás de los motores, frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, etc.
- En lugares con restos de comida o materiales orgánicos: debajo o detrás de los armarios de la cocina, cerca del cubo de basura, en los trasteros, en las bodegas, en los patios, etc.

No lo aplique sobre madera o superficies porosas. No exponga las gotas de cebo a la luz directa del sol o a fuentes de calor (Ej: radiador). No mezclar con otros productos químicos o en áreas recientemente tratadas con otro insecticida. En los almacenes, el producto solo se puede aplicar en presencia de alimentos debidamente envasados.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Cebo en gel listo para usar para aplicar en forma de gotitas con la jeringa o cartucho. Para uso interior en grietas y hendiduras en casas y edificios comerciales.

DOSIS

La dosis depende del nivel de infestación y de la especie de cucarachas (1 gota de 4 mm de diámetro = 0,04 g).

cucaracha común (*Blattella germanica*)	0,05 g/m² (1 gota/m²)	0,25 g/m² (5 gotas/m²)
cucaracha oriental (*Blatta orientalis*)	0,05 g/m² (1 gota/m²)	0,25 g/m² (5 gotas/m²)
cucaracha americana (*Periplaneta americana*)	0,05 g/m² (1 gota/m²)	0,25 g/m² (5 gotas/m²)

Frecuencia de aplicación:
1 aplicación cada 2 semanas. Volver a aplicar una vez más si la infestación persiste.

Frecuencia de tratamiento: Tres meses después de que la infestación termine, puede volverse a aplicar el tratamiento. Máximo 6 aplicaciones por año.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO:

El producto debería usarse alternado con otros productos que no contengan la misma sustancia activa, para evitar poblaciones resistentes. Los cebos no deben colocarse en lugares donde puedan contaminar alimentos, piensos o agua potable. El producto debe volver a aplicarse una vez se acabe solo hasta que la infestación sea controlada. Utilice el producto a las dosis y las frecuencias recomendadas. Para optimizar el tratamiento, respetar unas buenas prácticas de higiene: eliminar o impedir el acceso a otras fuentes de alimento que están disponibles para las cucarachas.

El cebo debe ser la principal fuente de comida disponible para las cucarachas. Para optimizar la eficacia, revise los puntos de cebo una vez a la semana y reemplace o reponga el cebo si está dañado o sucio. El producto debe aplicarse de forma segura para minimizar el riesgo de consumo por otros animales o niños. Usar en áreas ocultas de difícil acceso y alejadas del agua. Deseche el producto no utilizado, su embalaje y todos los demás residuos (insectos muertos) de acuerdo con las regulaciones locales.

Adoptar métodos integrados de control de plagas, como la combinación de métodos químicos y físicos de control y otras medidas de salud pública, teniendo en cuenta las especificidades locales (condiciones climáticas, especies objetivo, condiciones de uso, etc.) Compruebe la eficacia del producto en el sitio: si es necesario, se debe identificar la causa de una eficacia reducida para asegurar que no hay resistencia o para identificar una posible resistencia potencial. No utilice el producto en áreas donde se sospeche o se establezca resistencia. Informe al titular de la autorización si el tratamiento es ineficaz.

Medidas de mitigación de riesgo específicas: Evite el contacto con las superficies tratadas. Usar guantes adecuados durante la aplicación. Evitar el contacto con los ojos y la piel. El producto no debe aplicarse en zonas accesibles a niños. Limitar el tratamiento a zonas fuera del alcance de los animales.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la piel con agua abundante. Si se produce irritación de la piel o sarpullido: consulte con un médico. EN CONTACTO CON LOS OJOS: Si se presentan síntomas lavar con agua abundante. Eliminar las lentes de contacto si se llevan y son fáciles de retirar. Llamar a un centro de toxicología o a un médico. Si es necesario, trasladar al accidentado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono 91 562 04 20

INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y SU ENVASE

Los recipientes vacíos, el producto no utilizado, el agua de lavado y otros residuos generados durante el tratamiento son considerados residuos peligrosos. Entregar estos residuos a un establecimiento o empresa registrados, de acuerdo con la normativa vigente. Codificar los residuos de acuerdo con la Decisión 2014/955/EU. No vertar al suelo, a las aguas superficiales ni a ningún tipo de alcantarillado.

El almacenamiento del producto en su envase original es de 4 años bajo condiciones normales. Proteger del frío. Mantener en el envase original herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Se recomienda almacenar el producto preferentemente a una temperatura entre 5ºC y 45ºC. Almacenar lejos de la luz. No almacenar cerca de alimentos, bebidas y piensos.

ADVERTENCIA: El fabricante garantiza la formulación y el contenido. El usuario asume los riesgos por los daños que pudieran derivarse de hechos que escapan al control del fabricante, así como los perjuicios debidos a un almacenamiento o aplicación inadecuada del producto.

Lote y fecha de caducidad impreso en el cartucho. ma/ar

Magnumgel IGRPLUS

CUCARACHAS
CAFARDS
BARATAS

CEBO EN GEL (LISTO PARA SU USO)
APPÂT EN GEL (PRÊT À L'EMPLOI)
ISCO GEL (PRONTO A USAR)

MYLVA S.A.
Vía Augusta, 48
08006 Barcelona
Tel. +34 93 415 32 26
mylva@mylva.eu | www.mylva.eu

Contenido
Contenu
Conteúdo
4 x 40 gr ℮

Composición / Composition / Composição: Imidacloprid / Imidacloprid / Imidacloprida (Nº CAS 138261-41-3) 2,15% | S-metopreno / S-méthoprène / S-metopreno (Nº CAS 65733-16-6) 0,50% | OIT / OIT / OIT (Nº CAS 26530-20-1) 0,04% | Bitrex® 0,005% | Excipientes (c.s.p) / Excipients (q.s.p) / Excipientes (q.s.p) 100%

Uso por personal profesional especializado - Nº DE REGISTRO: ES/APP/NAI - 2021-ib-00146 - Se recomienda conservar el producto a una temperatura entre 5ºC y 45ºC. - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Contiene 2-octyl-2H-isothiazol-3-ona (OIT) y 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-ona (BIT). Puede provocar una reacción alérgica. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido/recipiente a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. **Utilisation par personnel qualifié** - Nº D'ENREGISTREMENT: FR-2021-00145 - Il est recommandé de conserver le produit à une température comprise entre 5ºC et 45ºC. - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient du 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (OIT) et du 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-one (BIT). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de la portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Éviter la mise dans l'environnement. Récupérer le produit renversé. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. **Uso por personal profesional especializado** - É aconselhável guardar o produto a uma temperatura entre os 5ºC e os 45ºC. - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Contém 2-octyl-2H-isothiazol-3-ona (OIT) e 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-ona (BIT). Pode provocar uma reação alérgica. Manter fora do alcance das crianças. Ler atentamente e seguir todas as instruções. Evitar a liberação para o ambiente. Recolher o produto derramado. Descarte o conteúdo/recipiente em acordo as normas locais. UFI: NK20-30R0-U00K-A3S0

ATENCIÓN
ATTENTION
ATENÇÃO

COPIA NO VÁLIDA

Magnumgel IGRPLUS CAFARDS

FR **MAGNUM GEL CAFARDS IGR** est un insecticide et un régulateur de croissance contre les blattes (*Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*). L'imidaclopride tue les cafards en 2-3 semaines. De plus, le S-méthoprène provoque l'infertilité chez les femelles et les nymphes, de sorte qu'elles ne peuvent pas se reproduire ou devenir des adultes reproducteurs. L'appât est attrayant pour les cafards même après 4 ans de stockage.

MODE D'EMPLOI

Instructions d'utilisation: Se conformer aux instructions d'utilisation. Effectuer une inspection avant d'appliquer le produit pour vérifier le niveau d'infestation et les zones touchées. Utiliser uniquement en intérieur dans des endroits inaccessibles aux enfants et aux animaux.

Instructions d'utilisation spécifiques: Les gouttes adhèrent aux surfaces non-poreuses. Application à l'intérieur de bâtiments commerciaux et d'habitation dans les fissures et les crevasses uniquement. Ecarter toute source alimentaire pendant le traitement. N'appliquer le produit biocide que sur des surfaces restreintes dans les fissures et crevasses pouvant servir de refuge aux blattes:

- dans des endroits inaccessibles aux enfants et aux animaux de compagnie
- dans les endroits sombres : sous l'évier, derrière les toilettes, près des tuyaux d'évacuation, etc.
- dans les endroits chauds : fissures et crevasses derrière les moteurs, réfrigérateurs, machines à laver, lave-vaisselle, etc.
- dans les lieux avec des déchets alimentaires ou des matières organiques : sous ou derrière les armoires de cuisine, près de la poubelle, dans les débarras, dans les caves, etc.

Ne pas utiliser sur du bois ou des surfaces poreuses. Déposer le produit à l'abri des rayons du soleil ou d'une source de chaleur (ex. ne pas le placer sous un radiateur). Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ou dans des zones traitées avec un autre insecticide. Dans les pièces de stockage le produit ne doit être appliqué qu'en présence d'aliments correctement emballés.

MÉTHODE D'APPLICATION:

Appât en gel prêt à l'emploi, à appliquer sous forme de gouttes à l'aide d'une seringue ou d'une cartouche. Application à l'intérieur de bâtiments commerciaux et d'habitation dans les fissures et les crevasses.

DOSES:

Appliquer selon le degré d'infestation (1 goutte = 0,04 g).

Blatta germanica (Blattella germanica)	**0,12 g/m² (3 gouttes)**	**0,16 g/m² (4 gouttes)**
Blatta orientalis (Blattella orientalis)	**0,16 g/m² (4 gouttes)**	**0,24 g/m² (6 gouttes)**
Blatta americana (Periplaneta americana)	**0,16 g/m² (4 gouttes)**	**0,24 g/m² (6 gouttes)**

Fréquence d'application:

lors d'un traitement: 1 application. Ne réappliquer le produit qu'une seule fois si l'infestation persiste après 2 semaines.

Fréquence de traitement: 3 mois après la fin de l'infestation, le traitement peut être répété. Maximum 6 applications par an.

MESURES DE GESTION DE RISQUE:

Ce produit doit être utilisé en alternance avec d'autres produits ne contenant pas la même substance active pour éviter l'émergence de populations résistantes. Ne pas appliquer le produit directement sur ou à proximité de denrées alimentaires, surfaces ou ustensiles qui pourraient être en contact avec des denrées ou des boissons destinées à la consommation (humaine ou animale) ou avec des animaux de rente. Une fois consommé, ce produit peut être réappliqué jusqu'à maîtrise de l'infestation. Utiliser les produits aux doses et aux fréquences recommandées. Pour optimiser l'efficacité, vérifier les appâts une fois par semaine et remplacer les appâts s'ils sont abîmés ou sales. Le produit doit être appliqué en toute sécurité de manière à minimiser le risque de consommation par les animaux ou enfants. Appliquer de manière ciblée dans des zones difficilement accessibles, non susceptibles d'être lavées et totalement à l'abri de l'eau.

Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et autres mesures d'hygiène publique, en tenant compte des spécificités locales (conditions climatiques, espèces cibles, conditions d'usage, etc.). Vérifier l'efficacité du produit sur site : le cas échéant, les causes de diminution de l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance. Ne pas utiliser le produit dans des zones où la résistance à la substance active contenue dans le produit est suspectée ou établie. Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.

Mesures de gestion de risque spécifiques: Eviter le contact avec les surfaces traitées. Porter des gants résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas appliquer dans des endroits accessibles aux enfants et aux animaux.

PREMIERS SOINS:

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Rincer la peau à l'eau. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Si des symptômes apparaissent, rincer à l'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Appeler un centre antipoison/un médecin ou appeler le 15/112. Si nécessaire, emmener la personne à l'hôpital et montrer l'étiquette ou l'emballage si possible. Ne pas laisser la personne contaminée seule.

Conseil médical pour les médecins et le personnel soignant: Traitement symptomatique et de soutien.

SI UN AVIS MÉDICAL EST NÉCESSAIRE, GARDER L'ÉTIQUETTE OU LE RÉCIPIENT À PORTÉE DE MAIN ET CONSULTER UN CENTRE ANTIPOISON : 33 (0)1.40.05.48.48 (Paris)

INSTRUCTIONS POUR UNE ELIMINATION SANS DANGER DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE:

Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (éviers, toilettes...), les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur. Eliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet (boîte d'appât), dans un circuit de collecte approprié.

La durée de stockage dans son contenant d'origine est de 4 ans dans des conditions normales. Protéger du gel. Conserver dans un endroit sec et ventilé ou aéré dans l'emballage commercial fermé. Stocker le produit à une température comprise entre 5°C et 45°C. Stocker à l'abri de la lumière. Ne pas stocker à proximité de denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'eau de boisson. Stocker hors de portée des enfants et animaux de compagnie.

ATTENTION: Le fabricant garantit la formule et le contenu. L'usager assume les risques de dommages qui pourraient provenir de faits échappant au contrôle du fabricant, ainsi que les préjudices causés par un stockage ou une application non adéquate du produit.

Lot et date de péremption indiqués sur la cartouche.

Magnumgel IGRPLUS BARATAS

PT **MAGNUM GEL BARATAS IGR PLUS** é um inseticida e regulador de crescimento contra baratas (*Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*). O imidaclopride mata as baratas em 2-3 semanas. Além disso, o S-metopreno causa infertilidade em mulheres e ninfas, de forma que elas não podem se reproduzir ou se tornarem adultos reprodutivos. A isca é atraente para as baratas mesmo após 4 anos de armazenamento.

MODO DE EMPREGO

Instruções de utilização: Ler sempre a etiqueta ou a brochura antes da utilização e respeitar as respetivas instruções. Inspecione o local antes da aplicação do produto, para verificar o nível de infestação e as áreas afetadas. Use apenas dentro de casa fora do alcance de crianças e animais.

Instruções específicas de utilização: As gotas aderem a superfícies não porosas. Aplicar o produto biocida exclusivamente em fendas e fissuras. Uso interno em residências particulares. Antes do tratamento, remova todas as fontes de alimentos naturais da área infestada para promover a ingestão do gel. Aplicar o produto apenas como aplicação pontual em fendas e fendas onde as baratas possam estar fora do alcance de crianças e animais:

- Locais inacessíveis: atrás de móveis, etc.
- Locais escuros: em baixo da pia, atrás do banheiro, perto do ralo, etc.
- Em locais quentes: rachaduras e fendas atrás de motores, geladeiras, máquinas de lavar, lava-louças, etc.
- Em locais com restos de comida ou materiais orgânicos: em baixo ou atrás de armários de cozinha, perto da lata de lixo, em depósitos, em porões, em pátios, etc.

Não utilizar sobre madeira ou superfícies porosas. Não expor as gotas de isca à luz solar ou a fontes de calor (p.ex., aquecedor). Não misturar com outros produtos químicos, nem utilizar em áreas recentemente tratadas com outros inseticidas. Em armazéns, o produto só pode ser aplicado na presença de alimentos devidamente embalados.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Isca gel pronta para usar para aplicar como gotículas com a seringa ou cartucho. Uso interno em fendas e fissuras em edifícios comerciais e residências particulares.

DOSE

La dosis depende del nivel de infestación y de la especie de cucarachas (1 gota de 4 mm de diámetro = 0,04 g).

Blatta germanica (Blattella germanica)	**0,12 g/m² (3 gotas)**	**0,16 g/m² (4 gotas)**
Blatta orientalis (Blattella orientalis)	**0,16 g/m² (4 gotas)**	**0,24 g/m² (6 gotas)**
Blatta americana (Periplaneta americana)	**0,16 g/m² (4 gotas)**	**0,24 g/m² (6 gotas)**

Frequência de aplicação:

1 aplicação em 2 semanas. Voltar a aplicar, caso a infestação persista.

Frequência de tratamento: o tratamento pode ser repetido três meses depois de terminada a infestação. Máximo de 6 aplicações por ano.

MEDIDAS DE REDUÇÃO DO RISCO:

Este produto deve ser alternado com outros produtos de diferente modo de ação, para evitar o desenvolvimento de populações resistentes. O isco não deve ser colocado em locais onde os alimentos, rações ou água potável possam ser contaminados. O produto deve ser reaplicado quando terminado, apenas até a praga estar controlada. Utilizar o produto nas doses e intervalos recomendados. Para otimizar a eficácia do tratamento, devem ser respeitadas as boas práticas higiénicas: remover ou impedir o acesso a todos os alimentos. O isco deve ser o único alimento disponível para as baratas. Para otimizar a eficácia, inspecione o isco uma vez por semana e substitua/reabastecer o isco, se este estiver danificado ou estragado. O produto deve ser aplicado de modo a minimizar o risco de consumo por outros animais ou crianças. Utilizar apenas em locais escondidos, de difícil acesso e afastados da água. Descartar o produto não utilizado, a respetiva embalagem e todos os restantes lixo (p.ex., insetos mortos), de acordo com os regulamentos locais.

Adotar métodos integrados de gestão de pragas, tais como a combinação de produtos químicos, métodos de controlo físico e outras medidas de saúde pública, tendo em conta as especificidades locais (condições climatéricas, espécies visadas, condições de utilização, etc.). Verificar a eficácia do produto no local: se necessário, a causa da reduzida eficácia deve ser investigada, para garantir que não há resistência, ou para identificar potenciais resistências. Não utilizar o produto em áreas onde se verifique ou suspeite de resistência. Informar o titular da autorização se o tratamento for ineficaz.

Medidas de mitigação do risco específicas: Evitar o contacto com superfícies tratadas. Use luvas adequadas durante a aplicação. Evitar o contacto com os olhos e a pele. O produto não deve ser aplicado em zonas acessíveis a crianças.O tratamento deve ser limitado a áreas fora do alcance dos animais.

INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS:

No caso de contacto com a pele, lavar com muita água. Se ocorrer irritação ou erupção na pele: consulte um médico. No caso de contacto com os olhos, se ocorrerem sintomas, lave com água em abundância. Remova as lentes de contato se usadas e fáceis de remover. Ligue para um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou médico. Se necessário, transportar o paciente para um hospital e, se possível mostrar a etiqueta ou a embalagem. Não abandonar a pessoa envenenada.

Aconselhamento para médicos e pessoal de saúde: Tratamento sintomático e de suporte.

NO CASO DE NECESSIDADE DE ACONSELHAMENTO MÉDICO, TENHA À MÃO A EMBALAGEM OU A ETIQUETA E CONTACTE O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS: (CAV)+351 800 250 250

INSTRUÇÕES PARA A ELIMINAÇÃO SEGURA DO PRODUTO E SUA EMBALAGEM:

Recipientes vazios, restos de produtos e outros resíduos gerados durante a aplicação são considerados resíduos perigosos. Entregue os referidos resíduos a um gestor de resíduos perigosos autorizado, de acordo com os regulamentos em vigor.

Codifique os resíduos de acordo com a Decisão 2014/955/UE. Não descartar o produto atirando-o para o chão, lançando-o sobre os cursos de água, despejando-o no lava-loiça ou pelo esgoto abaixo.

A estabilidade de armazenamento deste produto na embalagem original é de 4 anos, em condições normais de armazenamento. Proteja do frio. Manter na embalagem original fechada hermeticamente. Manter as embalagens bem fechadas num local seco, fresco e bem ventilado. Recomenda-se armazenar o produto preferencialmente a uma temperatura entre 5ºC e 45ºC. Armazene longe da luz. Não armazene perto de comida, bebida e pensos.

ADVERTENCIA: O fabricante garante a formulação e o conteúdo. O usuario assume os riscos pelos danos que possam causar danos que escaparam ao controlo do fabricante, assim como os prejuízos devidos ao armazenamento ou aplicação inadequada do produto.

Lote e validação impressos no cartucho

CONTROWELLA