

# SERPA-RAT PASTA

## Bromadiolona Plus

### CEBO EN PASTA, LISTO PARA SU USO

**SERPA-RAT PASTA BROMADIOLONA PLUS** es un rodenticida anticoagulante de la sangre, eficaz para el control de Rata gris, parda o noruega (*Rattus norvegicus*) y Ratón común (*Mus musculus*), tanto en las especies juveniles como en las adultas. Sus efectos no aparecen hasta pasados de 3 a 7 días de la ingestión de los cebos, por lo que los roedores no lo rechazan, aumentando de esta forma su efectividad.

**CATEGORÍA DE USUARIO** Uso por personal profesional especializado.

**INSTRUCCIONES DE USO** Realice una encuesta previa al tratamiento del área infestada y una evaluación in situ para identificar las especies de roedores, sus áreas de actividad y determine la causa y la extensión de la infestación. Retirar la comida fácilmente disponible para los roedores (ej.: grano suelto o residuos de alimentos). Aparte de esto, no limpiar la zona a tratar justo antes del tratamiento, esto solo molestará a los roedores y la aceptación del cebo será más difícil de alcanzar.

El producto debe ser usado como parte de un plan integral de control de plagas, incluyendo, entre otros, medidas de higiene y, cuando sea posible, métodos físicos de control. El producto debe ser colocado en las inmediaciones de los lugares donde se ha observado actividad de roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras...). Cuando sea posible, el portacebos debe estar fijado al suelo o a otras estructuras. Cuando el producto se utiliza en zonas públicas, las zonas tratadas deben marcarse durante el periodo de tratamiento y una señal explicativa debe informar sobre el riesgo de envenenamiento primario y secundario de los anticoagulantes así como sobre las medidas de primeros auxilios. Los cebos deben ser asegurados para evitar que sean arrastrados fuera del portacebos. Colocar los portacebos fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas, animales de granja y otros animales no objetivo. No se debe aplicar en áreas donde los alimentos, platos, bebidas, utensilios de cocina o las superficies de procesamiento de alimentos puedan entrar en contacto con el producto o bien ser contaminados por el mismo. Usar guantes protectores resistentes a productos químicos durante la fase de manipulación. Durante el uso del producto no comer, beber o fumar. Lavar las manos y áreas de piel expuestas después de utilizar el producto. La frecuencia de las visitas a las áreas tratadas debe ser a criterio del aplicador, en virtud de las encuestas realizadas al comienzo del tratamiento. Esa frecuencia debe ser consistente con las recomendaciones proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas. Si la cantidad de cebo ingerido es baja en relación al tamaño aparente de la infestación, se debe considerar la colocación de más portacebos y la posibilidad de cambiar a otra formulación cebo. Si después de un periodo de tratamiento de 35 días se observa que los cebos siguen siendo consumidos y no disminuye la actividad de roedores, debe determinarse la causa. Cuando se hayan excluido otros elementos, es probable que para los roedores resistentes haya que considerar el uso de un rodenticida no anticoagulante o un rodenticida anticoagulante más potente. También debe considerarse el uso de trampas como una medida de control alternativa. No abrir la bolsita que contiene el cebo. Seguir las instrucciones adicionales proporcionadas por el Manual de Buenas Prácticas.

**INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DEL USO** En interiores, retirar el producto sobrante al final del tratamiento. En alrededores de edificaciones y en áreas abiertas y vertederos, proteger los cebos de las condiciones atmosféricas (ej.: lluvia, nieve, etc.). Colocar el portacebos en zonas sujetas a inundación. Reemplazar los cebos que hayan sido dañados por el agua o contaminados por la suciedad. Retirar el producto sobrante al final del tratamiento.

**MÉTODO DE APLICACIÓN** Cebo en pasta, listo para su uso, en portacebos resistentes a la manipulación, en bolsitas.

**DOSIS Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:**

ESPECIE	DOSIS	ÁMBITO DE UTILIZACIÓN
Ratas ( <i>Rattus norvegicus</i> )	Portacebos con 100-200 gramos por punto de cebo.	Interiores, alrededores de edificaciones y áreas abiertas y vertederos.
Ratones ( <i>Mus musculus</i> )	Portacebos con 60-100 gramos por punto de cebo.	Interiores

**MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO** Cuando sea posible, antes del tratamiento informar a los transeúntes sobre la campaña de control de roedores (de acuerdo con el código aplicable de buenas prácticas, si los hay). No utilizar en áreas donde se sospeche que existe resistencia a la sustancia activa. Los productos no deberán utilizarse más de 35 días sin una evaluación del estado de la infestación y de la eficacia del tratamiento. No alternar el uso de diferentes sustancias activas anticoagulantes con potencias comparables o menor con el propósito de gestionar las resistencias. Si se alternan, considerar el uso de rodenticidas no anticoagulantes, si existen, o un rodenticida anticoagulante más potente. No lavar el portacebos u otros utensilios utilizados en los puntos de cebo cubiertos o protegidos con agua entre aplicaciones. Eliminar los roedores muertos a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

**MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO ESPECÍFICAS DEL USO** Aplicar medidas de control preventivas (ej.: taponar agujeros, retirar comida y bebida en la medida de lo posible) para mejorar la ingesta de cebo y reducir la probabilidad de reinvasión. Para reducir el riesgo de envenenamiento secundario, buscar y retirar los roedores muertos a intervalos frecuentes durante el tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el Manual de buenas prácticas. No usar el producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de roedores o para detectar la actividad de los roedores. No usar el producto en tratamientos de cebado por pulsos.

En interiores, este producto solo se utilizará en lugares no accesibles para niños ni animales no objetivo. En áreas abiertas, vertederos y alrededor de edificaciones, no aplicar el producto directamente en madrigueras.

**PRIMEROS AUXILIOS** Este producto contiene una sustancia anticoagulante. En caso de ingestión, los síntomas pueden hacerse evidentes hasta en un plazo de 72 horas. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sangrado de nariz y encías. En casos severos, puede haber moratones y presencia de sangre en heces u orina. Antídoto: vitamina K1 administrada únicamente por personal médico veterinario.

En caso de exposición dérmica, lavar la piel con agua y a continuación con agua y jabón. En caso de exposición ocular, compruebe siempre la presencia de lentes de contacto y retírelas, enjuague los ojos con líquido para enjuagar los ojos o agua, mantener los ojos abiertos al menos 10 minutos. En caso de exposición oral, enjuague la boca cuidadosamente con agua. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No provocar el vómito. Si se ingiere, busque consejo médico, mantenga a mano la etiqueta o el envase y consulte al SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (teléfono 91 562 04 20). Contacte con un veterinario en caso de que lo ingiera una mascota. Peligroso para la fauna salvaje. Cuando los portacebos se coloquen cerca de aguas superficiales (ej. ríos, lagos, canales de agua, diques, canal de riego/acequia) o sistemas de drenaje de agua asegúrese de que el cebo no entra en contacto con el agua.

**INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y SU ENVASE** Al final del tratamiento elimínese el cebo no consumido y el envase a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Se recomienda como método de tratamiento la incineración. Almacenar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el envase cerrado y alejado de la luz. Mantener fuera del alcance de los niños, pájaros, mascotas y animales de granja. El producto es estable durante 2 años.

Puede dañar al feto. Provoca daños en los órganos (sangre) tras exposiciones prolongadas o repetidas. Solicitar instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Llevar guantes de protección. Consultar a un médico en caso de malestar. Guardar bajo llave. Elimínese el contenido y/o su recipiente, así como los roedores muertos, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

Nº de registro: ES/BB(NA)-2018-14-00454

**Contenido:**

<b>COMPOSICIÓN:</b>	
Bromadiolona (s.a.) CAS 28772-56-7	0.005%
Sustancia de sabor amargo	0.002%
Excipientes c.s.p	100%

**LEA Y SIGA LA INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ASÍ COMO CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE ACOMPAÑE AL PRODUCTO O PROPORCIONADA EN EL PUNTO DE VENTA ANTES DE USARLO.**



**PELIGRO**



**MYLVA S.A.**  
Via Augusta, 48  
08006 Barcelona  
Tel. 902 109 114  
mylva@mylva.es  
www.mylva.es